دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

زایمان زودرس همچنان دلیل اصلی مرگ زودرس نوزادان است. ریسک عوارض و مرگ ومیر نوزادی به خصوص وقتی زایمان قبل از 32 هفته اتفاق می افتد افزایش می یابد . داروی نیفیدیپین نسبت به داروی سولفات منیزیم به طور موثر تری زایمان را به یک هفته بعد به تاخیر می اندازد . داروی نیفیدیپین و سولفات منیزیم و نیتروگلیسرین به طور یکسانی موجب تاخیر بیش از یک هفته ای زایمان می شوند و موثر تر از داروی ریتودرین می باشند. با توجه به اثر بخشی داروهای فوق توصیه می شود بر اساس شرایط مادر و جنین در صورت نیاز به تاخیر یک هفته ای از ریتودرین و در مواردی که نیاز به تاخیر بیشتر از یک هفته است از یکی از سه داروی نیفیدیپین و سولفات منیزیم و نیتروگلیسرین استفاده شود. کلیدواژه ها : ریتودرین، نیفیدیپین، زایمان زودرس، انقباضات زودرس، مرور سیستماتیک، متاآنالیزگروه های مخاطب : ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی ،مدیران، سیاستگزاران، برنامه ریزان ، پژوهشگرانمشخصات طرح مرتبط :عنوان پروژه : مقایسه کارایی نیفیدیپین و ریتودرین بر سایرس انقباضات زودرس زایمانی و نمره آپگار نوزاد : یک مرور سیستماتیک و متاانالیزمحل انجام طرح : دانشگاه علوم پزشکی نیشابورمجری اصلی: مریم زمانی ، دکتر آزموده | تاریخ اتمام طرح : 1403/10/01 | کد طرح: 9901234

1 / 1

Phoca PDF